

MASOTEN

O Masoten é um ectoparasiticida indicado para ectoparasitas em peixes.

Modo de usar:

O Masoten deve ser diluído em água. Prepare uma calda contendo a dosagem a ser utilizada no tratamento de tanque escavado. A quantidade total da calda deve ser aplicada de forma homogênea em toda a extensão do tanque.



Dosagens:

| Espécie | Parasitas Ativos | Dose | Número de Aplicação | Intervalo de Aplicação |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Pacu | Monogenéticos | 1g/10.000L | 2 | 48 h |
| | <i>Anacanthorus penilabiatus</i> | | | |
| | <i>Argulus sp</i> | 1g/10.000L | 3 | 48 h |
| | <i>Dolops carvalhoi</i> | | | |
| | <i>Thrichodina pediculus</i> | | | |
| | <i>Thricodina magna</i> | 1g/10.000L | 4 | 48 h |
| | <i>Ichthyophthirius multifiliis</i> | | | |
| | <i>Pscinodinium pululare</i> | | | |
| | Tilápia | Monogenéticos | 5g/10.000L | 2 |
| <i>Anacanthorus penilabiatus</i> | | | | |
| <i>Argulus sp</i> | | 5g/10.000L | 3 | 48 h |
| <i>Dolops carvalhoi</i> | | | | |
| <i>Thrichodina pediculus</i> | | | | |
| <i>Thricodina magna</i> | | 5g/10.000L | 4 | 48 h |
| <i>Ichthyophthirius multifiliis</i> | | | | |
| <i>Pscinodinium pululare</i> | | | | |

**Para Pacu:**

O fluxo de água deve ser mantido aberto de forma que os peixes permaneçam em contato com o produto por apenas o período de 1 hora.

Para Tilápias:

O fluxo de água deve ser fechado de modo a permitir o contato dos peixes com o produto por um período de 1 hora.

Período de carência:

O período de carência para o consumo de carne de animais tratados para o consumo humano é de 22 dias para pacu e 40 dias para tilápias. Estes resultados foram a partir de estudos de zonas aquícolas com temperatura da água superior a 27°C.

Advertência:

Evitar o contato com os olhos, pele, boca e vestimenta.

Perigo: para uso veterinário apenas. O produto não deve ser utilizado em humanas e o uso em desacordo com a bula pode representar riscos à saúde e à vida.

Precauções gerais:

Seguir adequadamente as dosagens, taxa de renovação da água. Do tanque escavado, intervalos entre as doses e frequência de uso, respeitando o intervalo de 30 dias entre os ciclos de tratamento. Não armazenar o produto diluído. Uma vez diluído o produto deverá ser imediatamente utilizado. Não aplique ou guarde junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Conservar a embalagem fechada em local seco e fresco (entre 15 e 30°C) ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.